

胆道癌 06

対象疾患:胆道癌

## 【0506】イミフィンジ療法

初回からの単独使用不可。イミフィンジ+GC療法後に適応。

\* 体重確認 \* 体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kgとする。

【投与スケジュール】 1コース=28日(4週)

1コース

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W	4W
デュルバルマブ	イミフィンジ	DUR	1500mg/body	↓ Day1			

## 【投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
<b>Day1</b>			
①	生理食塩液 50mL	1本	ルート確保用
②	イミフィンジ点滴静注	1500mg/body	60分以上かけて
	生理食塩液 100mL	1本	
③	生理食塩液 50mL	1本	5分

&lt;イミフィンジ&gt;

インラインフィルター(0.2又は0.22ミクロン)を使用すること

## 【催吐性リスク】

最小度リスク

## 【組織障害性】

イミフィンジ:不明(非炎症性薬剤に準ずる:メーカー回答)

## 【注意事項】

(イミフェンジ)

□ 初回からの単独使用不可。イミフィンジ+GC療法後に適応。

□ 患者選択にあたっては初回投与前チェックリストで投与の可否を判断すること