

その他 06

対象疾患:川崎病(小児)

【9906】レミケード(川崎病)25kg 未満**【投与スケジュール】**

一般名	商品名	略号	投与量	単回
インフリキシマブ	レミケード	IFX	5mg/kg	2時間以上かけて投与

(用量・用法)

【川崎病】

通常、体重1kg当たり5mgを1回の投与量とし点滴静注する。

体重 25kg 未満は生理食塩水 50mL に希釈。25kg 以上は 100mL に希釈。

【注射薬投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液 100mL	1本	ルート確保用
②	レミケード	5mg/kg	2時間
	生理食塩液 50mL	1本	
③	生理食塩液 50mL	1本	5分(ルートリンス)

<レミケード>

インラインフィルター(1.2ミクロン以下)を使用すること

組織傷害性	レミケード:非炎症性(明確な基準なし。メーカー回答)
-------	----------------------------

【注意事項】

(レミケード)

他の注射剤、輸液等と混合しないこと(ブドウ糖注射液等の汎用される注射液でも配合変化が確認されているため)

溶解後3時間以内に投与開始をすること

原則、2時間以上をかけて緩徐に点滴静注すること。

また、点滴時間を短縮した際にinfusion reactionが認められた場合には、次回以降の投与では、点滴時間を短縮せずに投与すること