

## 【0101】5-FU+I-LV(RPMI)療法(3&amp;1)

## 【投与スケジュール】1コース=28日(4週)

1コース

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W	4W
レボホリナートカルシウム	レボホリナート	I-LV	250mg/m <sup>2</sup>	↓ Day1	↓ Day8	↓ Day15	
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5-FU	600mg/m <sup>2</sup>	↓ Day1	↓ Day8	↓ Day15	

## 【投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
<b>Day1, 8, 15</b>			
①	グラニセトンバッグ(3mg/100mL)	1本	30分
	デカドロン(3.3mg/1mL)	2A	
②	レボホリナート	250mg/m <sup>2</sup>	2時間
	生理食塩液 500mL	1本	
③ (②開始 1時間後)	フルオロウラシル	600mg/m <sup>2</sup>	全開で
	生理食塩液 50mL	1本	

催吐性	中等度リスク
組織傷害性	フルオロウラシル:炎症性
代表的副作用	>10%...食欲不振、下痢、口内炎、骨髄抑制 頻度不明...心筋虚血、白質脳症

## 【注意事項】

- ・フルオロウラシルは、レボホリナート開始 1 時間後に bolus 投与する。
- ・original は、Day1, 8, 15, 22, 29, 36 投与 8 週ごと