

## 【0110a】セツキシマブ単剤療法【初回用】

※2 コース目以降は「大腸 10 セツキシマブ単剤療法」を使用してください

## 【投与スケジュール】1 コース=7 日

1 コース

一般名	商品名	略号	投与量	1W
セツキシマブ	アービタックス	Cmab	初回 400mg/m <sup>2</sup> (2 回目以降 250mg/m <sup>2</sup> )	↓ Day1

## 【投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
<b>Day1</b>			
①	ネオレスタール注 10mg	1 本	15 分
	デカドロン 3.3mg	2 本	
	生理食塩液 50mL	1 本	
②	アービタックス	400mg/m <sup>2</sup>	120 分
	生理食塩液 500mL	400mL	
③	生理食塩液 100mL	1 本	60 分

催吐性	最小度(予防的制吐剤使用なし)
組織傷害性	アービタックス:非炎症性
代表的副作用	>10%・・・皮疹、皮膚乾燥、掻痒、爪囲炎、口内炎、疲労、食欲不振、低 Mg 血症、Infusion Reaction

## 【注意事項】

(アービタックス)

- RAS 遺伝子野生型を確認すること
- infusion reaction を軽減させるため、投与前に抗ヒスタミン剤の前投薬を行うこと。さらに投与前に副腎皮質ホルモン剤を投与すると infusion reaction が軽減することがある
- 投与量と速度:初回は 400mg/m<sup>2</sup> を 2 時間かけて、2 回目以降は 250mg/m<sup>2</sup> を 1 時間かけて点滴投与する(10mg/分以下)
- 終了後はラインを生理食塩液でフラッシュすること
- 投与中は毎回患者の状態に十分に注意し、投与後は1時間の観察期間を設けること