

【0119】【大腸癌】SOX 療法

【投与スケジュール】1 コース=21 日(3 週)

1 コース

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W
オキサリプラチン	エルプラット	L-OHP	130mg/m ²	↓ Day1		
テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	エスワン	S-1、 TS-1	80-120mg/日	Day1 夕食後 ~Day15 朝食後		

【投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	グラニセロンバッグ(3mg/100mL)	1 本	30 分
	デカドロン(3.3mg/1mL)	3 管	
②	エルプラット	130mg/m ²	120 分
	5%ブドウ糖液 500mL	1 本	
③	生理食塩液 50mL	1 本	5 分

催吐性	中等度リスク
組織傷害性	エルプラット:炎症性
代表的副作用	エルプラット >10%...悪心、嘔吐、末梢神経障害、感覚異常、疲労、骨髄抑制 1~10%...アレルギー反応 エスワン >10%...悪心・嘔吐、食欲不振、下痢、口内炎、骨髄抑制、倦怠感、色素沈着 頻度不明...流涙

【エスワン用量】 ※腎機能低下時の減量基準あり

体表面積	1 日用量(mg)	1 日用量(錠)	用法
1.25 m ² 未満	80mg	20mg 錠 4 錠	1 日 2 回 朝・夕食後 2 週服用・1 週休薬 (※)
1.25 m ² 以上 1.50 m ² 未満	100mg	25mg 錠 4 錠	
1.50 m ² 以上	120mg	20mg 錠 6 錠	

(※) Day1 夕食後~Day15 朝食後

【注意事項】

(エルプラット)

- 塩化物を含む輸液との配合を避ける(溶解液は 5%ブドウ糖液のみ可)
- 塩基性溶液との混和もしくは同じ点滴ラインを用いた同時投与は行わないこと