

## 【0101a】5-FU+I-LV(RPMI)療法(1週毎)

## 【投与スケジュール】1コース=56日(8週)

1コース

一般名	略号	投与量	1W	2W	3W	4W	5W	6W	7W	8W
レボホリナートカルシウム	I-LV	250mg/m <sup>2</sup>	↓ Day1	↓ Day8	↓ Day15	↓ Day22	↓ Day29	↓ Day36		
フルオロウラシル	5-FU	600mg/m <sup>2</sup>	↓ Day1	↓ Day8	↓ Day15	↓ Day22	↓ Day29	↓ Day36		

※レジメンシステム上の休薬完了は7日で設定

## 【投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
<b>Day1、8、15、22、29、36</b>			
①	グラニセロンバッグ(3mg/100mL)	1本	30分
	デカドロン(3.3mg/1mL)	2A	
②	レボホリナート	250mg/m <sup>2</sup>	2時間
	生理食塩液 500mL	1本	
③ (②開始 1時間後)	フルオロウラシル	600mg/m <sup>2</sup>	全開で
	生理食塩液 50mL	1本	

催吐性	中等度リスク
組織傷害性	フルオロウラシル:炎症性
代表的副作用	>10%・・・食欲不振、下痢、口内炎、骨髄抑制 頻度不明・・・心筋虚血、白質脳症

## 【注意事項】

- ・フルオロウラシルは、レボホリナート開始1時間後に bolus 投与する。
- ・original は、Day1、8、15、22、29、36 投与 8週ごと