

【0121】IRIS 療法

【投与スケジュール】1 コース=28 日

1 コース

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W	4W
イリノテカン	イリノテカン	CPT-11,IRI	125mg/m ²	↓ Day1		↓ Day15	
【内服】 テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	【内服】 エスワン	S-1, TS-1	80-120mg/日	Day1 夕食後～ Day15 朝食後		休薬	

【投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1, Day15			
①	グラニセロンバック 3mg/100mL	1 本	30 分
	デカドロン 3.3mg/1mL	3 本	
②	イリノテカン	125mg/m ²	90 分
	生理食塩液 500mL	1 本	
③	生理食塩液 50mL	1 本	ルートリンス
Day1 夕食後～Day15 朝食後			
内服	エスワン	80-120mg/m ² /日	朝夕食後

【エスワン 用法・用量】

体表面積	1 日用量 (mg)	1 日用量 (錠)	用法
1.25 m ² 未満	80mg	20mg 錠 4 錠	1 日 2 回 朝・夕食後
1.25 m ² 以上 1.5 m ² 未満	100mg	25mg 錠 4 錠	
1.5 m ² 以上	120mg	20mg 錠 6 錠	2 週服用 2 週休薬(※)

(※) Day1 夕食後～Day15 朝食後

催吐性	軽度リスク
組織傷害性	イリノテカン: 炎症性
代表的副作用	イリノテカン >10%・・・骨髄抑制、下痢、悪心、嘔吐、食欲不振 <1%・・・間質性肺炎 エスワン >10%・・・悪心・嘔吐、食欲不振、下痢、口内炎、骨髄抑制、倦怠感、色素沈着 頻度不明・・・流涙

【注意事項】

(エスワン)

- レジメンセットには組んでありません。別途処方入力してください

(カンプト)

- UGT1A1 遺伝子多型検査時には、院内規定の説明文書・同意書を使用する

レジメン登録承認	2014 年 8 月 21 日 化学療法委員会
論文名	Irinotecan plus S-1 (IRIS) versus fluorouracil and folinic acid plus irinotecan (FOLFIRI) as second-line chemotherapy for metastatic colorectal cancer: a randomised phase 2/3 non-inferiority study (FIRIS study)
掲載雑誌名	Lancet Oncol 2010; 11: 853-60
著者名	Muro K, Boku N, Shimada Y, et al.