

【0125】CAPIRI 療法(XELIRI 療法)

【投与スケジュール】1 コース=21日(3週)

1 コース

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W
イリノテカン	イリノテカン	CPT-11,IRI	200mg/m ²	↓ Day1		
カペシタビン	カペシタビン	Cape	1800~3000 mg/日	Day1 夕食後~Day15 朝食後		休薬

【投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	グラニセトロンバック 3mg/100mL	1 本	30 分
	デカドロン 3.3mg/1mL	3 本	
②	イリノテカン	200mg/m ² ※	90 分
	生理食塩液 500mL	1 本	
③	生理食塩液 50mL	1 本	ルートリンス

※ UGT1A1 遺伝子多型検査がホモ型、*6/*28のダブルヘテロ型では、イリノテカンを 150mg/m² に減量

【カペシタビン 用法・用量】

体表面積	1 日用量(mg)	1 日用量(錠)	用法
1. 31m ² 未満	1800mg	300mg錠 6 錠	1 日 2 回 朝・夕食後
1. 31m ² 以上1. 64m ² 未満	2400mg	300mg錠 8 錠	
1. 64m ² 以上	3000mg	300mg錠 10 錠	2 週服用 1 週休薬(※)

(※) Day1 夕食後~Day15 朝食後

催吐性	中等度リスク(30~90%)
組織傷害性	イリノテカン: 炎症性
代表的副作用	イリノテカン >10%...骨髄抑制、下痢、悪心、嘔吐、食欲不振 <1%...間質性肺炎 カペシタビン >10%...悪心、食欲不振、下痢、口内炎、手足症候群、骨髄抑制

【注意事項】

(カペシタビン)

- レジメンセットには組んでありません。別途処方入力してください

(イリノテカン)

- 初回投与時に UGT1A1 遺伝子多型検査を行って下さい。院内規定の説明文書・同意書があります

レジメン登録承認	2019年3月 化学療法委員会
論文名	Modified XELIRI(capecitabine plus irinotecan) versus FOLFIRI(leucovorin, fluorouracil, and irinotecan), both either with or without bevacizumab, as second-line therapy for metastatic colorectal cancer (AXEPT): a multicentre, open-label, randomised, non-inferiority, phase 3 trial
著者名	Muro K, Boku N, Shimada Y, et al.