

## SIRB 療法 (Bev+CPT-11+TS-1 療法)

## 【投与スケジュール】1 コース=21日 (3週)

1 コース

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W
ベバシズマブ	アバステン	Bev,BV, Bmab	7.5mg/m <sup>2</sup>	↓ Day1		
イリノテカン	イリノテカン	CPT-11, IRI	150mg/m <sup>2</sup>	↓ Day1		
【内服】 テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	【内服】 エスワン	TS-1 S-1	80,100,120mg/日	Day1 夕食後～Day15 朝食後		休薬

## 【投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
<b>Day1</b>			
①	生理食塩液 50mL	1 本	ルート確保
②	アバステン	7.5mg/Kg	90～30 分 ※1
	生理食塩液 100mL	1 本	
③	グラニセトロンパック 3mg/100mL	1 本	30 分
	デカドロン 3.3mg/1mL	3 本	
④	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	90 分
	生理食塩液 500mL	1 本	
⑤	生理食塩液 50mL	1 本	ルートリンス

※1 アバステンは初回 90 分、過敏症状等問題がなければ、2 回目 60 分、3 回目 30 分と短縮可

## 【エスワン 用法・用量】

体表面積	1 日用量 (mg)	1 日用量 (錠)	用法
1.25m <sup>2</sup> 未満	80mg	20mg 錠 4 錠	1 日 2 回 朝・夕食後  2 週服用 1 週休薬(※2)
1.25m <sup>2</sup> 以上 1.5m <sup>2</sup> 未満	100mg	25mg 錠 4 錠	
1.5m <sup>2</sup> 以上	120mg	20mg 錠 6 錠	

(※2) Day1 夕食後～Day15 朝食後

催吐性	中等度リスク(30~90%)
組織傷害性	アバスチン:非炎症性 イリノテカン:炎症性
代表的副作用	アバスチン >10%...高血圧、蛋白尿、出血 <1%...血栓塞栓症、消化管穿孔、創傷治癒遅延、可逆性後白質脳症症候群 イリノテカン >10%...骨髄抑制、下痢、悪心、嘔吐、食欲不振 <1%...間質性肺炎 エスワン >10%...悪心・嘔吐、食欲不振、下痢、口内炎、骨髄抑制、倦怠感、色素沈着 頻度不明...流涙

【注意事項】

(エスワン)

- レジメンセットには組んでありません。内服のみのセットがあります。別途処方入力してください。

(イリノテカン)

- UGT1A1 遺伝子多型検査時には、院内規定の説明文書・同意書を使用してください。

レジメン登録承認	2020年2月 化学療法委員会
論文名	S-1 and irinotecan plus bevacizumab versus mFOLFOX6 or CapeOX plus bevacizumab as first-line treatment in patients with metastatic colorectal cancer(TRICOLORE):a randomized,open-label,phase III,noninferiority trial
著者名	Yamada Y, et al.