

【0132】Bev+Cape 療法

【投与スケジュール】1 コース=21 日(3 週)

1 コース

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W
ベバシズマブ	アバステン	Bev,BV,Bmab	7.5mg/kg	↓ Day1		
カペシタビン	カペシタビン	Cape	2000mg/m ² /日	↓ Day1 夕~Day15 朝		

【投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液 50mL	1 本	ルート確保
②	アバステン	7.5mg/kg	90~30 分 (※)
	生理食塩液 100mL	1 本	
③	生理食塩液 50mL	1 本	ルートリンス

(※)アバステンは初回 90 分、過敏症状等問題なければ 2 回目 60 分、3 回目 30 分と短縮可

催吐性	最小度(アバステンのみ)
組織傷害性	アバステン:非炎症性
代表的副作用	アバステン >10%…高血圧、蛋白尿、出血 <1%…血栓塞栓症、消化管穿孔、創傷治癒遅延、可逆性後白質脳症症候群 カペシタビン >10%…悪心、食欲不振、下痢、口内炎、手足症候群、骨髄抑制

【カペシタビン(300mg/錠)用法・用量】 ※C 法

体表面積	1 日用量(mg)	1 日用量(錠)	用法
1.3 m ² 未満	2400mg	8 錠	1 日 2 回 朝・夕食後
1.36 m ² 以上 1.66 m ² 未満	3000mg	10 錠	
1.66 m ² 以上 1.96 m ² 未満	3600mg	12 錠	2 週服用 1 週休薬 (※2)
1.96 m ² 以上	4200mg	14 錠	

(※2) Day1 夕食後~Day15 朝食後

【注意事項】

(アバステン)

□ 初回の投与速度は 90 分投与とし、問題が無ければ、60 分、30 分と短縮可