

【0133】Bev+TAS-102(ロンサーフ)

【投与スケジュール】1 コース=28 日(4 週)

1 コース

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W	4W
ベバシズマブ	アバスチン	Bev,BV, Bmab	5mg/kg	↓ Day1		↓ Day15	
【内服】 トリフルリジン・チピラ シル塩酸塩配合錠	【内服】 ロンサーフ	TAS-102 FTD/TPI	70mg/m ² /日	Day1 夕 ~Day6 朝 (※1)	Day8 夕 ~Day13 朝	休薬	

(※1)翌日朝から内服する場合は Day2 朝~Day6 夕, Day9 朝~Day13 夕となる

【投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液 50mL	1 本	ルート確保
②	アバスチン	5mg/kg	90~30 分 (※1)
	生理食塩液 100mL	1 本	
③	生理食塩液 50mL	1 本	ルートリンス
Day1 夕~Day6 朝			
内服	ロンサーフ	70mg/m ² /日	朝夕食後
Day8 夕~Day13 朝			
内服	ロンサーフ	70mg/m ² /日	朝夕食後
Day15			
①	生理食塩液 50mL	1 本	ルート確保
②	アバスチン	5mg/kg	90~30 分 (※2)
	生理食塩液 100mL	1 本	
③	生理食塩液 50mL	1 本	ルートリンス

(※2)アバスチンは初回 90 分、過敏症状等問題なければ 2 回目 60 分、3 回目 30 分と短縮可

催吐性	最小度(アバステンのみ)
組織傷害性	アバステン:非炎症性
代表的副作用	アバステン >10%…高血圧、蛋白尿、出血 <1%…血栓塞栓症、消化管穿孔、創傷治癒遅延、可逆性後白質脳症症候群 ロンサーフ >10%…白血球減少、貧血、血小板減少、悪心、嘔吐、下痢、疲労、食欲減退

【ロンサーフ用法・用量】 70mg/m²/日 (35mg/m²/回)

体表面積	1日用量(mg)	1日用量(錠)	用法
1.07 m ² 未満	70mg	15mg2錠 20mg2錠	1日2回 朝・夕食後 (※3) 5日間内服 2日間休薬 を2回 ○Day1 夕食後～ Day6 朝食後 ○Day8 夕食後～ Day13 朝食後
1.07 m ² 以上 1.23 m ² 未満	80mg	20mg4錠	
1.23 m ² 以上 1.38 m ² 未満	90mg	15mg6錠	
1.38 m ² 以上 1.53 m ² 未満	100mg	15mg4錠 20mg2錠	
1.53 m ² 以上 1.69 m ² 未満	110mg	15mg2錠 20mg4錠	
1.69 m ² 以上 1.84 m ² 未満	120mg	20mg6錠	
1.84 m ² 以上 1.99 m ² 未満	130mg	15mg6錠 20mg2錠	
1.99 m ² 以上 2.15 m ² 未満	140mg	15mg4錠 20mg4錠	
2.15 m ² 以上	150mg	15mg2錠 20mg6錠	

(※3)空腹時内服はトリフルリジンの血中濃度が上昇するため避ける

【休薬の目安に該当する副作用のため休薬し、コース中に再開基準を満たせず再開できなかった場合】
最終内服から少なくとも連続して14日休薬してから次のコースを開始。

【減量の目安に該当する有害事象】

好中球数	500/mm ³ 未満
血小板数	50,000/mm ³ 未満

上記値まで減少したのち、回復後再開する場合は10mg/日ずつ減量(50mg/日の場合は朝20mg、夕30mg)

【注意事項】

(アバステン)

初回の投与速度は90分投与とし、問題が無ければ、60分、30分と短縮可