

【0106】Xelox(CapeOX)療法

【投与スケジュール】1コース=21日(3週)

1コース

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W
オキサリプラチン	エルプラット	L-OHP	130mg/m ²	↓Day1		
カペシタビン	ゼローダ	Cape	2000mg/m ² /日	↓Day1 夕~Day15 朝		

【投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	グラニセトロンバッグ(3mg/100mL)	1本	30分
	デカドロン(3.3mg/1mL)	3管	
②	エルプラット	130mg/m ²	120分
	5%ブドウ糖液 500mL	1本	
③	生理食塩液 50mL	1本	5分

催吐性	中等度リスク
組織傷害性	エルプラット:炎症性
代表的副作用	エルプラット >10%...悪心、嘔吐、末梢神経障害、感覚異常、疲労、骨髄抑制 1~10%...アレルギー反応 ゼローダ >10%...悪心、食欲不振、下痢、口内炎、手足症候群、骨髄抑制

【ゼローダ(300mg/錠)用法・用量】C法

体表面積	1日用量(mg)	1日用量(錠)	用法
1.3 m ² 未満	2400mg	8錠	1日2回 朝・夕食後
1.36 m ² 以上 1.66 m ² 未満	3000mg	10錠	
1.66 m ² 以上 1.96 m ² 未満	3600mg	12錠	2週服用 1週休薬 (※)
1.96 m ² 以上	4200mg	14錠	

(※) Day1 夕食後~Day15 朝食後

【注意事項】

(エルプラット)

- 塩化物を含む輸液との配合を避ける(溶解液は5%ブドウ糖液のみ可)
- 塩基性溶液との混和もしくは同じ点滴ラインを用いた同時投与は行わないこと