

## 【0109】Bev+Xelox (CapeOX) 療法

## 【投与スケジュール】1 コース=21 日 (3 週)

1 コース

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W
ベバシズマブ	アバステン	Bev,BV,Bmab	7.5mg/kg	↓ Day1		
オキサリプラチン	エルプラット	L-OHP	130mg/m <sup>2</sup>	↓ Day1		
カペシタビン	カペシタビン	Cape	2000mg/m <sup>2</sup>	↓ Day1 夕～Day15 朝		

## 【投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
<b>Day1</b>			
①	生理食塩液 50mL	1 本	ルート確保
②	アバステン	7.5mg/kg	90～30 分 (※)
	生理食塩液 100mL	1 本	
③	グラニセロンバッグ (3mg/100mL)	1 本	30 分
	デカドロン (3.3mg/1mL)	3 管	
④	エルプラット	130mg/m <sup>2</sup>	120 分
	5%ブドウ糖液 500mL	1 本	
⑤	生理食塩液 50mL	1 本	ルートリンス

(※)アバステンは初回 90 分、過敏症状等問題なければ 2 回目 60 分、3 回目 30 分と短縮可

催吐性	中等度リスク
組織傷害性	アバステン:非炎症性 エルプラット:炎症性
代表的副作用	アバステン >10%…高血圧、蛋白尿、出血 <1%…血栓塞栓症、消化管穿孔、創傷治癒遅延、可逆性後白質脳症症候群 エルプラット >10%…悪心、嘔吐、末梢神経障害、感覚異常、疲労、骨髄抑制 1～10%…アレルギー反応 ゼローダ >10%…悪心、食欲不振、下痢、口内炎、手足症候群、骨髄抑制

## 【カペシタビン(300mg/錠)用法・用量】 ※C 法

体表面積	1 日用量 (mg)	1 日用量 (錠)	用法
1.3 m <sup>2</sup> 未満	2400mg	8 錠	1 日 2 回 朝・夕食後  2 週服用 1 週休薬 (※2)
1.36 m <sup>2</sup> 以上 1.66 m <sup>2</sup> 未満	3000mg	10 錠	
1.66 m <sup>2</sup> 以上 1.96 m <sup>2</sup> 未満	3600mg	12 錠	
1.96 m <sup>2</sup> 以上	4200mg	14 錠	

(※2) Day1 夕食後～Day15 朝食後

【注意事項】

(アバスチン)

□ 初回の投与速度は 90 分投与とし、問題が無ければ、60 分、30 分と短縮可

(エルプラット)

□ 塩化物を含む輸液との配合を避ける(溶解液は 5%ブドウ糖液のみ可)

□ 塩基性溶液との混和もしくは同じ点滴ラインを用いた同時投与は行わないこと