

乳癌 16

対象疾患:乳癌(転移・再発)

## 【0216】ハラヴェン療法

## 【投与スケジュール】1 コース=21 日

1 コース

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W
エリブリン	ハラヴェン	eribulin	1.4mg/m <sup>2</sup>	↓ Day1	↓ Day8	

## 【投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
<b>Day1, 8</b>			
①	生理食塩液 50mL	1 本	ルート確保
②	ハラヴェン	1.4mg/m <sup>2</sup>	5 分
	生理食塩液 50mL	30mL	
③	生理食塩液 50mL	1 本	ルートリンス

催吐性	最小度リスク
組織傷害性	非壊死性
代表的副作用	>30%…骨髄抑制(白血球減少、貧血、血小板減少) 悪心、口内炎、疲労、発熱、食欲減退、脱毛 30~5%…嘔吐、下痢、便秘、腹痛、倦怠感、浮腫、味覚異常、頭痛、めまい、筋肉痛、関節痛、咳嗽、発疹 等 <5%…口腔内乾燥、歯肉炎等、傾眠、不眠、眼乾燥等

□投与時間が長くなると好中球減少が強くなるため、できるだけ短時間で投与する。5分以内に投与するため生食の量を 30ml にしている。