

乳癌 18

対象疾患：(進行・再発)乳癌

【0218】nab-PTX 療法

【投与スケジュール】 1コース=21日

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W	4W
パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	アブラキサン	nab-PTX	260mg/m ²	↓ Day1			↓ Day1

【投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	グラニセロンバッグ(3mg/100mL)	1本	30分
	デカドロン(3.3mg)	2A	
②	アブラキサン	260mg/m ²	30分
	生理食塩液 100mL	適量(※)	
③	生理食塩液 50mL	1本	5分(ルートリンス)

(※)アブラキサン懸濁後の総液量は、アブラキサン 1バイアル(100mg)あたり 20mL

<パクリタキセル(アルブミン懸濁型)(アブラキサン®)>
 インラインフィルターは**使用しない**こと
 他の薬剤等との配合又は同じ静注ラインで同時注入しないこと
 滴下速度は以下のように算出する

$$\text{滴下速度} \left(\frac{\text{滴数}}{\text{分}} \right) = 0.73 \times \text{投与液量(mL)} + 10.96$$

【催吐性リスク】

軽度リスク

【組織障害性】

アブラキサン:壊死性

【注意事項】

(アブラキサン)

- (※)懸濁液は生食を使用し、5mg/mL(アブラキサン 1バイアル(100mg)あたり 20mL)となるように調製する
- 人血清アルブミンを使用した特定生物由来薬品です。初回には「化学療法同意書」以外に「特定生物由来薬品に関する説明・同意書」も取得してください。