

乳癌 20

対象疾患：(HER2 陽性の手術不能又は再発)乳癌

【0220】カドサイラ療法

【投与スケジュール】 1 コース=21 日

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W	4W
トラスツズマブ エムタンシン	カドサイラ	T-DM1	3.6mg/kg	↓ Day1			↓ Day1

【投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
①	生理食塩液 50mL	1 本	5 分(ルートリンス)
②	カドサイラ	3.6mg/kg	90 分※
	生理食塩液 250mL	1 本	
③	生理食塩液 50mL	1 本	ルートリンス

※カドサイラ投与時間は、初回投与の忍容性が良好ならば、2 回目以降は投与時間を 30 分まで短縮可

<カドサイラ>

インラインフィルター(0.2 もしくは 0.22 ミクロン)を使用すること

【催吐性リスク】

カドサイラ:最少度(メーカー回答)

【組織障害性】

カドサイラ:非炎症性(メーカー回答)

【注意事項】

(カドサイラ)

- 他剤と混合しないこと
- ブドウ糖液との混合を避け、同じ点滴ラインを用いた同時投与を行わないこと
- 点滴静注のみとすること
- 薬液が血管外に漏れないように投与すること
- 初回投与は 90 分投与とし、忍容性が良好ならば、2 回目以降は 30 分に短縮可能である

レジメン登録承認	2014 年 12 月 15 日 化学療法委員会
論文名	Trastuzumab Emtansine for HER-2Positive Advanced Breast Cancer
掲載雑誌名	N Engl J Med. 2012;367(19):1783-91
著者名	Verma S et al:EMILIA Study Group