

乳癌 21

対象疾患: (HER2 陽性) 乳癌

【0221】HER+DOC(DTX)療法

※初回投与時は「乳癌 21a HER+DTX 療法【初回用】」を使用してください

【投与スケジュール】 1 コース=21 日

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W	4W
トラスツズマブ	ハーセプチン	HER, Tmab	(初回のみ 8mg/kg) 6mg/kg	↓ Day1			↓ Day1
ドセタキセル	ドセタキセル	DTX, DOC	60mg/m ²	↓ Day1			↓ Day1

【投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液 50mL	1 本	ルート確保用
②	ハーセプチン	6mg/kg	※90 分
	生理食塩液 250mL	1 本	
③	デカドロン 3.3mg/1mL	2 本	30 分
	グラニセトロンバッグ 3mg/100mL	1 本	
④	ドセタキセル	60mg/m ²	60 分
	生理食塩液 250mL	1 本	
⑤	生理食塩液 50mL	1 本	ルートリンス

(※)初回投与の忍容性が良好ならば、2 回目以降は投与時間を 30 分まで短縮可

催吐性	ハーセプチン: 最少度リスク ドセタキセル: 低リスク
組織傷害性	ハーセプチン: 非炎症性 ドセタキセル: 壊死性
代表的副作用	ハーセプチン >10%…Infusion Reaction(約 40%) 1~10%…左室駆出率低下
	ドセタキセル >10%…骨髄抑制、悪心嘔吐、脱毛、倦怠感、末梢神経障害、皮疹、爪の変化、感染 <1%…浮腫、体液貯留(胸水など)

【注意事項】

(ハーセプチン)

- 初回投与は 90 分投与とし、忍容性が良好ならば、2 回目以降は 30 分に短縮可能である (ドセタキセル点滴静注)
- 添加物として無水エタノールを含有しない

レジメン登録承認	2015 年 8 月 化学療法委員会(予定)
参考資料	乳癌診療ガイドライン ①治療編 2013 年版