

乳癌 24a

対象疾患：(HER2 陽性)乳癌

## 【0224a】PER+HER 療法【初回用】

※2 コース目以降は「乳癌 24 PER+HER 療法」を使用してください

## 【投与スケジュール】 1 コース=21 日

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W
ペルツズマブ	パージェタ	PER	初回 840mg/body (2 回目以降 420mg/body)	↓ Day1		
トラスツズマブ	ハーセプチン	HER、Tmab	初回 8mg/kg (2 回目以降 6mg/kg)	↓ Day1		

## 【投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
<b>Day1</b>			
①	生理食塩液 50mL	1 本	ルート確保用
②	パージェタ	840mg/body	60 分
	生理食塩液 250mL	1 本	
③	ハーセプチン	8mg/kg	90 分
	生理食塩液 250mL	1 本	
④	生理食塩液 50mL	1 本	ルートリンス

催吐性	パージェタ: 最小度リスク ハーセプチン: 最少度リスク
組織傷害性	パージェタ: 非炎症性(メーカー回答) ハーセプチン: 非炎症性
代表的副作用	パージェタ: 骨髄抑制、Infusion Reaction、アナフィラキシー、過敏症、間質性肺疾患、左室機能不全
	ハーセプチン >10%…Infusion Reaction(約 40%) 1~10%…左室駆出率低下

## 【注意事項】

(パージェタ)

□ 前回投与から 6 週以上の時は初回量で行う。

(ハーセプチン)

□ 初回投与は 90 分投与とし、忍容性が良好ならば、2 回目以降は 30 分に短縮可能である

レジメン登録承認	2021 年 2 月 化学療法委員会(予定)
参考資料	乳癌診療ガイドライン ①治療編 2018 年版