

乳癌 04

対象疾患: 乳癌

## 【0204】FEC100 療法

## 【投与スケジュール】 1コース=21日

1コース

| 一般名       | 商品名      | 略号   | 投与量                  | 1W     | 2W | 3W | 4W     |
|-----------|----------|------|----------------------|--------|----|----|--------|
| エピルビン     | エピルビン    | EPI  | 100mg/m <sup>2</sup> | ↓ Day1 |    |    | ↓ Day1 |
| フルオロウラシル  | フルオロウラシル | 5-FU | 500mg/m <sup>2</sup> | ↓ Day1 |    |    | ↓ Day1 |
| シクロホスファミド | エンドキサン   | CPA  | 500mg/m <sup>2</sup> | ↓ Day1 |    |    | ↓ Day1 |

## 【投与日のタイムテーブル】

| 滴下順            | ルート | 薬品名               | 用量                   | 投与時間               |
|----------------|-----|-------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Day1</b>    |     |                   |                      |                    |
| ①              | 主管  | 生理食塩液 250mL       | 1本                   | ルート確保～フラッシュ        |
| 内服             |     | アプレピタントカプセル 125mg | 1カプセル                | エピルビン開始<br>60～90分前 |
| ②              | 側管  | アロキシ 0.75mg       | 1本                   | 30分                |
|                |     | デカドロン 3.3mg/1mL   | 3本                   |                    |
|                |     | 生理食塩液 100mL       | 1本                   |                    |
| ③              | 側管  | エピルビン             | 100mg/m <sup>2</sup> | 全開で                |
|                |     | 生理食塩液 100mL       | 50mL                 |                    |
| ④              | 側管  | フルオロウラシル          | 500mg/m <sup>2</sup> | 15分                |
|                |     | 生理食塩液 50mL        | 1本                   |                    |
| ⑤              | 側管  | エンドキサン            | 500mg/m <sup>2</sup> | 60分                |
|                |     | 生理食塩液 250mL       | 1本                   |                    |
| <b>Day2, 3</b> |     |                   |                      |                    |
| 内服             |     | アプレピタントカプセル 80mg  | 1カプセル/日              | 分1 午前中             |
| 内服             |     | デカドロン錠 0.5mg      | 16錠/日                | 分2 朝・昼食後           |

総投与量制限あり エピルビン 900mg/m<sup>2</sup>まで

|        |  |
|--------|--|
| 催吐性    | 高度リスク  |
| 組織傷害性  | エピルビシン:壊死性<br>フルオロウラシル:炎症性<br>エンドキサン:炎症性   |
| 代表的副作用 | エピルビシン<br>>10%・・・骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、口内炎、脱毛<br>1～10%・・・心毒性   |
|        | フルオロウラシル<br>>10%・・・食欲不振、下痢、口内炎、骨髄抑制<br>頻度不明・・・心筋虚血、白質脳症  |
|        | エンドキサン<br>>10%・・・骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、出血性膀胱炎、不妊<br>1～10%・・・鼻閉、顔面紅潮、皮疹、頭痛<br><1%・・・うっ血性心不全、不整脈、出血性心筋炎、心タンポナーデ、静脈性側性肝疾患 |

## 【注意事項】

投与ルートは閉鎖式システムを使用すること。