

乳癌 08

対象疾患:乳癌

【0208】TC 療法

【投与スケジュール】 1コース=21日

1コース

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W	4W
ドセタキセル	ドセタキセル	DTX	75mg/m ²	↓ Day1			↓ Day22
シクロホスファミド	エンドキサン	CPA	600mg/m ²				

【投与日のタイムテーブル】

滴下順	ルート	薬品名	用量	投与時間
①	主管	生理食塩液 250mL	1本	ルート確保 ～フラッシュ
②	側管	グラニセトロンバック 3mg/100mL	1本	30分
		デカドロン 3.3mg/1mL	3管	
③	側管	ドセタキセル	75mg/m ²	1時間
		生理食塩液 250mL	1本	
④	側管	エンドキサン	600mg/m ²	1時間
		生理食塩液 250mL	1本	

催吐性	ドセタキセル:軽度リスク エンドキサン:中等度リスク
組織傷害性	ドセタキセル:壊死性 エンドキサン:炎症性
代表的副作用	ドセタキセル >10%…骨髄抑制、悪心嘔吐、脱毛、倦怠感、末梢神経障害、皮疹、爪の変化、感染 <1%…浮腫、体液貯留(胸水など)
	エンドキサン >10%…骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、出血性膀胱炎、不妊 1～10%…鼻閉、顔面紅潮、皮疹、頭痛 <1%…うっ血性心不全、不整脈、出血性心筋炎、心タンポナーデ、静脈性側性肝疾患

【注意事項】

(ドセタキセル点滴静注「ヤクルト」)

 添加物として無水エタノールを含有しない

(エンドキサン)

 揮発性が高く、接触や吸入によって、催奇形性や変異原性のリスクが他の抗がん剤に比べて高いので、

被爆に注意する。側管から投与し、終了時は側管を抜かない。

- ファシールの Lコネクタが刺し込み孔についているが、引き抜かないこと