

胃癌 10

対象疾患: 胃癌

## 【0310】nab-PTX 療法(3 週毎・A 法)

【投与スケジュール】 1 コース=21 日(3 週)

1 コース

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W
ナブ-パクリタキセル (アルブミン懸濁型パクリタキセル)	アブラキサン	nab-PTX	260mg/m <sup>2</sup>	↓ Day1		

## 【注射薬投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
<b>Day1</b>			
①	カイトリルバック 3mg/100mL	1 本	30 分
	デカドロン(3.3mg/1mL)	2A	
②	アブラキサン	260mg/m <sup>2</sup>	30 分
	生理食塩液 100mL	適量(※)	
⑤	生理食塩液 50mL	1 本	ルートリンス

(※)アブラキサン懸濁後の総液量は、アブラキサン 1 バイアル(100mg)あたり 20mL 適宜生食液量を調整

&lt;パクリタキセル(アルブミン懸濁型)(アブラキサン®)&gt;

- ・インラインフィルターは**使用しない**こと
- ・他の薬剤等との配合又は同じ静注ラインで同時注入しないこと
- ・滴下速度は以下のように算出する

$$\text{滴下速度} \left( \frac{\text{滴数}}{\text{分}} \right) = 0.73 \times \text{投与液量(mL)} + 10.96$$

催吐性	軽度リスク(10~30%)
組織傷害性	アブラキサン: 壊死性抗がん剤
代表的副作用	アブラキサン >10%…骨髄抑制、末梢神経障害、脱毛、筋肉痛、関節痛、皮疹、悪心

## 【注意事項】

(アブラキサン)

- (※)懸濁液は生食を使用し、5mg/mL(アブラキサン 1 バイアル(100mg)あたり 20mL)となるように調製する
- 人血清アルブミンを使用した特定生物由来薬品です。初回には「化学療法同意書」以外に「特定生物由来薬品に関する説明・同意書」も取得してください。