

胃癌 13

対象疾患: 胃癌

【0313】【胃癌】SOX 療法

【投与スケジュール】 1コース=21日(3週)

1コース

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W
オキサリプラチン	エルプラット	L-OHP	100mg/m ²	↓ Day1		
【内服】 テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	エスワンタイホウ	S-1,TS-1	80~120mg/日	14日間服用 (Day1 夕~Day15 朝)		7日間 休薬

【注射薬投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	デカドロン 3.3mg/1mL	3 管	30 分
	グラニセトロンバッグ 3mg/100mL	1 本	
②	エルプラット	100mg/m ²	120 分
	5%ブドウ糖液 500mL	1 本	
⑤	生理食塩液 50mL	1 本	ルートリンス

【ティーエスワン 用法・用量】

体表面積	1日用量(mg)	1日用量(錠)	用法
1.25 m ² 未満	80mg	20mg 錠 4 錠	1日2回 朝夕食後 2週服用 1週休薬(※)
1.25 m ² 以上 1.5 m ² 未満	100mg	25mg 錠 4 錠	
1.5 m ² 以上	120mg	20mg 錠 6 錠	

(※) Day1 夕食後~Day15 朝食後服用、Day15 夕食後~Day22 朝食後休薬

催吐性	中等度リスク(30~90%)
組織傷害性	エルプラット: 炎症性抗がん剤
代表的副作用	エルプラット >10%…悪心、嘔吐、末梢神経障害、感覚異常、疲労 1~10%…アレルギー反応
	エスワンタイホウ >10%…悪心・嘔吐、食欲不振、下痢、口内炎、骨髄抑制、倦怠感、色素沈着 頻度不明…流涙

【注意事項】

(エスワンタイホウ)

- レジメンセットに組んでありません。別途処方入力してください

(エルプラット)

- 塩化物を含む輸液との配合を避ける(溶解液は5%ブドウ糖液のみ可)
- 塩基性溶液との混和もしくは同じ点滴ラインを用いた同時投与は行わないこと

レジメン登録承認	2015年6月4日 化学療法委員会
参考資料	Yamada Y, et al. Ann Oncol., 2015;26(1):141-148