

胃癌 14

対象疾患: 胃癌

## 【0314】【胃癌】Xelox 療法

【投与スケジュール】 1コース=21日(3週)

1コース

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W
オキサリプラチン	エルプラット	L-OHP	130mg/m <sup>2</sup>	↓ Day1		
【内服】 カペシタビン	カペシタビン	Cape	2400~4200mg/日	14日間服用 (Day1 夕~Day15 朝)		7日間 休薬

## 【注射薬投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
<b>Day1</b>			
①	デカドロン 3.3mg/1mL	3 管	30 分
	グラニセトロンバッグ 3mg/100mL	1 本	
②	エルプラット	130mg/m <sup>2</sup>	120 分
	5%ブドウ糖液 500mL	1 本	
⑤	生理食塩液 50mL	1 本	ルートリンス

## 【ゼローダ(300mg/錠)用法・用量】

体表面積	1日用量(mg)	1日用量(錠)	用法
1.3 m <sup>2</sup> 未満	2400mg	8 錠	1日2回 朝・夕食後  2週服用 1週休薬 (※2)
1.36 m <sup>2</sup> 以上 1.66 m <sup>2</sup> 未満	3000mg	10 錠	
1.66 m <sup>2</sup> 以上 1.96 m <sup>2</sup> 未満	3600mg	12 錠	
1.96 m <sup>2</sup> 以上	4200mg	14 錠	

(※) Day1 夕食後~Day15 朝食後服用、Day15 夕食後~Day22 朝食後休薬

催吐性	中等度リスク(30~90%)
組織傷害性	エルプラット: 炎症性抗がん剤
代表的副作用	エルプラット >10%…悪心、嘔吐、末梢神経障害、感覚異常、疲労 1~10%…アレルギー反応
	カペシタビン >10%…悪心、食欲不振、下痢、口内炎、手足症候群、骨髄抑制

## 【注意事項】

(カペシタビン)

- レジメンセットに組んでありません。別途処方入力してください

(エルプラット)

- 塩化物を含む輸液との配合を避ける(溶解液は5%ブドウ糖液のみ可)
- 塩基性溶液との混和もしくは同じ点滴ラインを用いた同時投与は行わないこと

レジメン登録承認	2015年10月6日 化学療法委員会
参考資料	監修:日本胃癌学会 「治癒切除不能な進行・再発の胃癌 エルプラット点滴静注液の適正使用について」