

胃癌 20

対象疾患: 胃癌

【0320】ニボルマブ単剤 療法

【投与スケジュール】 1コース=14日(2週)

1コース

| 一般名 | 商品名 | 略号 | 投与量 | 1W | 2W | 3W |
|-------|-------|----------|------------|--------|----|--------|
| ニボルマブ | オブジーボ | Nivo、OPD | 240mg/body | ↓ Day1 | | ↓ Day1 |

【注射薬投与日のタイムテーブル】

| 滴下順 | 薬品名 | 用量 | 投与時間 |
|-------------|-------------|------------|----------|
| Day1 | | | |
| ① | 生理食塩液 50mL | 1本 | ルート確保用 |
| ② | オブジーボ点滴静注 | 240mg/body | 30分以上かけて |
| | 生理食塩液 100mL | 1本 | |
| ③ | 生理食塩液 50mL | 1本 | ルートリンス |

＜オブジーボ＞

インラインフィルター(0.2又は0.22ミクロン)を使用すること
シリコン製 CV ポート使用不可(末梢投与推奨)

| | |
|--------|--|
| 催吐性 | 最小度リスク |
| 組織傷害性 | オブジーボ: 不明(非炎症性薬剤に準ずる: メーカー回答) |
| 代表的副作用 | オブジーボ 間質性肺炎、大腸炎・重度の下痢、免疫性血小板減少紫斑病、甲状腺機能障害、腎障害、脳炎、静脈血栓塞栓症、重症筋無力症・心筋炎・筋炎・横紋筋融解症、1型糖尿病、肝機能障害・肝炎・硬化症胆管炎、神経障害、副腎障害、重度の皮膚障害、Infusion reaction |

【注意事項】

(オブジーボ)

- 患者選択に当たっては初回投与前チェックリストで投与の可否を判断すること
- 調製後は速やかに投与を開始すること
- シリコン製 CV ポート使用不可

| | |
|------|---|
| 参考資料 | 胃癌治療ガイドライン 第5版、オブジーボ胃癌の適正使用ガイド オブジーボ 固定用量への用法・用量変更のお知らせ(2018年8月作成) |
|------|---|