

胃癌 26

対象疾患：(HER2 陽性) 胃癌

【0326】HER+DOC(DTX)療法

※初回投与時は「胃癌 26a HER+DTX 療法【初回用】」を使用してください

【投与スケジュール】 1 コース=21 日

| 一般名 | 商品名 | 略号 | 投与量 | 1W | 2W | 3W | 4W |
|---------|--------|-----------|-------------------------|--------|----|----|--------|
| トラスツズマブ | ハーセプチン | HER, Tmab | (初回のみ 8mg/kg) 6mg/kg | ↓ Day1 | | | ↓ Day1 |
| ドセタキセル | ドセタキセル | DTX, DOC | 60mg/m ² | ↓ Day1 | | | ↓ Day1 |

【投与日のタイムテーブル】

| 滴下順 | 薬品名 | 用量 | 投与時間 |
|-------------|----------------------|---------------------|--------|
| Day1 | | | |
| ① | 生理食塩液 50mL | 1 本 | ルート確保用 |
| ② | ハーセプチン | 6mg/kg | ※90 分 |
| | 生理食塩液 250mL | 1 本 | |
| ③ | デカドロン 3.3mg/1mL | 2 本 | 30 分 |
| | グラニセトロンバッグ 3mg/100mL | 1 本 | |
| ④ | ドセタキセル | 60mg/m ² | 60 分 |
| | 生理食塩液 250mL | 1 本 | |
| ⑤ | 生理食塩液 50mL | 1 本 | ルートリンス |

(※)初回投与の忍容性が良好ならば、2 回目以降は投与時間を 30 分まで短縮可

| | |
|--------|--|
| 催吐性 | ハーセプチン:最少度リスク ドセタキセル:低リスク |
| 組織傷害性 | ハーセプチン:非炎症性 ドセタキセル:壊死性 |
| 代表的副作用 | ハーセプチン >10%…Infusion Reaction(約 40%) 1~10%…左室駆出率低下 |
| | ドセタキセル >10%…骨髄抑制、悪心嘔吐、脱毛、倦怠感、末梢神経障害、皮疹、爪の変化、感染 <1%…浮腫、体液貯留(胸水など) |

【注意事項】

(ハーセプチン)

- 初回投与は 90 分投与とし、忍容性が良好ならば、2 回目以降は 30 分に短縮可能である (ドセタキセル点滴静注)
- 添加物として無水エタノールを含有しない

| | |
|----------|------------------------|
| レジメン登録承認 | 2021 年 4 月 化学療法委員会(予定) |
| 参考資料 | 胃癌治療ガイドライン 2018 年版 |