

胃癌 30

対象疾患:胃癌

【0330】S1+DTX 療法

【投与スケジュール】 1コース=21日(3週)

1コース

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W
ドセタキセル	ドセタキセル	DTX DOC、TXT	40mg/日	↓ Day1		
【内服】 テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム	ティーエスワン	S-1、TS-1	80～120mg/日	14日間服用 (Day1 夕～Day15 朝)		7日間 休薬

【注射薬投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	デカドロン 3.3mg/1mL	2 管	30 分
	グラニセロンバッグ 3mg/100mL	1 本	
②	ドセタキセル	40mg/m ²	60 分
	生理食塩液 250mL	1 本	
⑤	生理食塩液 50mL	1 本	ルートリンス

【ティーエスワン 用法・用量】

体表面積	1日用量(mg)	1日用量(錠)	用法
1.25 m ² 未満	80mg	20mg 錠 4 錠	1日2回 朝・夕食後 2週服用 1週休薬(※)
1.25 m ² 以上 1.5 m ² 未満	100mg	25mg 錠 4 錠	
1.5 m ² 以上	120mg	20mg 錠 6 錠	

(※)Day1 夕食後～Day15 朝食後服用、Day15 夕食後～Day22 朝食後休薬

催吐性	軽度リスク(10～30%)
組織傷害性	ドセタキセル:壊死性
代表的副作用	ドセタキセル >10%…骨髄抑制、悪心嘔吐、脱毛、倦怠感、末梢神経障害、皮疹、爪の変化 <1%…浮腫、体液貯留(胸水など)
	ティーエスワン >10%…悪心・嘔吐、食欲不振、下痢、口内炎、骨髄抑制、倦怠感、色素沈着 頻度不明…流涙

【注意事項】

(ティーエスワン)

 レジメンセットに組んでありません。別途処方入力してください

(ドセタキセル点滴静注「ヤクルト」)

 添加物として無水エタノールを含有しない

レジメン登録承認	2022年2月 化学療法委員会
参考資料	胃癌ガイドライン 2021年7月改訂 第6版