

胃癌 30

対象疾患: 胃癌

## 術後補助化学療法 【0330】S1+DTX 療法

## 【投与スケジュール】

1 コース目(1 クールの期間:21 日)

1 コース

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W
【内服】 テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	ティーエスワン	S-1、TS-1	80~120mg/日	14 日間服用 (Day1 夕~Day15 朝)		7 日間 休薬

2~7 コース目(1 クールの期間:21 日)

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W
ドセタキセル	ドセタキセル	DTX DOC、TXT	40mg/日	↓ Day1		
【内服】 テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	ティーエスワン	S-1、TS-1	80~120mg/日	14 日間服用 (Day1 夕~Day15 朝)		7 日間 休薬

8 コース目以降(1 クールの期間:42 日)

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W	4W	5W	6W
【内服】 テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	ティーエスワン	S-1、TS-1	80~120mg/日	28 日間服用 (Day1 夕~Day29 朝)			14 日間 休薬		

## 【注射薬投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
<b>Day1</b>			
①	デカドロン 3.3mg/1mL	2 管	30 分
	グラニセトロンバッグ 3mg/100mL	1 本	
②	ドセタキセル	40mg/m <sup>2</sup>	60 分
	生理食塩液 250mL	1 本	
⑤	生理食塩液 50mL	1 本	ルートリンス

## 【ティーエスワン 用法・用量】

体表面積	1 日用量(mg)	1 日用量(錠)	用法
1.25 m <sup>2</sup> 未満	80mg	20mg 錠 4 錠	1 日 2 回 朝・夕食後 2 週服用 1 週休薬(※)
1.25 m <sup>2</sup> 以上 1.5 m <sup>2</sup> 未満	100mg	25mg 錠 4 錠	
1.5 m <sup>2</sup> 以上	120mg	20mg 錠 6 錠	

(※)Day1 夕食後~Day15 朝食後服用、Day15 夕食後~Day22 朝食後休薬

## 【再開方法の目安】

副作用による S-1 の休薬日数	再開方法の目安
同一クール内で S-1 の休薬が 8 日以上	次コースとして再開
同一クール内で S-1 の休薬が 7 日以内	同一コースとして再開

催吐性	軽度リスク(10～30%)
組織傷害性	ドセタキセル:壊死性
代表的副作用	ドセタキセル >10%…骨髄抑制、悪心嘔吐、脱毛、倦怠感、末梢神経障害、皮疹、爪の変化 <1%…浮腫、体液貯留(胸水など)
	ティーエスワン >10%…悪心・嘔吐、食欲不振、下痢、口内炎、骨髄抑制、倦怠感、色素沈着 頻度不明…流涙

## 【注意事項】

(ティーエスワン)

- レジメンセットに組んでありません。別途処方入力してください

(ドセタキセル点滴静注「ヤクルト」)

- 添加物として無水エタノールを含有しない

レジメン登録承認	2022 年 2 月 化学療法委員会
参考資料	胃癌ガイドライン 2021 年 7 月改訂 第 6 版