


胃癌 07

対象疾患: 胃癌

## 【0307】MTX+5-FU 交代療法

【投与スケジュール】 1コース=7日(1週)



## 【投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間	Day1			7
① 11:15	ダイアモックス 500mg	1 瓶	点滴	↓			休 薬 完 了
	生理食塩液 50mL	1 瓶	15 分				
② 11:30	グラニセロン 3mg バック	1 本	点滴	↓			
	デカドロン 3.3mg	2 本	30 分				
③ 12:00	メトレキセート	100mg/m <sup>2</sup>	点滴	↓			
	生理食塩液 50mL	1 本	15 分				
④ 12:15	ソリタ T3 号 500mL	1 瓶	点滴	↓			
	メイロン 7%20mL	2 本	3 時間				
⑤ 15:15	5-FU	600mg/m <sup>2</sup>	点滴	↓			
	生理食塩液 50mL	1 瓶	全開で				
⑥	生理食塩液 50mL	1 瓶	点滴 5 分 ルートリンス用	↓			
滴下順	薬品名	用量	投与時間		Day2	3	
① 12:00	ロイコボリン 3mg	5A	静脈内注射		↓	↓	
② 18:00	ロイコボリン 3mg	5A	静脈内注射		↓	↓	
③ 24:00	ロイコボリン 3mg	5A	静脈内注射		↓		
④ 翌 6:00	ロイコボリン 3mg	5A	静脈内注射		↓		

## 【催吐性リスク】

軽度

## 【組織障害性】

メトレキセート: 非炎症性

5-FU: 炎症性

## 【注意事項】

(メトレキセート)

- ロイコボリンの投与は、通常、メトレキセート投与後 24 時間目よりロイコボリンとして 1 回 15mg を 6 時間間隔で 2~6 回(メトレキセート投与後 24, 30, 36, 42, 48, 56 時間目)静脈内(又は筋肉内注射あるいは経口)投与