

膵臓癌 02

対象疾患:膵臓癌

【0402】nab-PTX+GEM 療法

【投与スケジュール】 1コース=28日(4週)

1コース

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W	4W
パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	アブラキサン	nab-PTX	125mg/m ²	↓ Day1	↓ Day8	↓ Day15	
ゲムシタビン	ジェムザール	GEM	1000mg/m ²	↓ Day1	↓ Day8	↓ Day15	

【投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1、8、15			
①	アロキシ静注 0.75mg	1本	30分
	デカドロン 3.3mg/1mL	2管	
	生理食塩液 100mL	1本	
②	アブラキサン	125mg/m ²	30分
	生理食塩液	適量※	
③	生理食塩液 50mL	1本	5分
④	ジェムザール	1000mg/m ²	30分
	生理食塩液 100mL	1本	
⑤	生理食塩液 50mL	1本	ルートリンス

(※)アブラキサン懸濁後の総液量は、アブラキサン1バイアル(100mg)あたり20mL
適宜生食液量を調整

<パクリタキセル(アルブミン懸濁型)(アブラキサン®)>

- ・インラインフィルターは**使用しない**こと
- ・他の薬剤等との配合又は同じ静注ラインで同時注入しないこと
- ・滴下速度は以下のように算出する

$$\text{滴下速度} \left(\frac{\text{滴数}}{\text{分}} \right) = 0.73 \times \text{投与液量(mL)} + 10.96$$

催吐性	中等度リスク(30~90%)
組織障害性	アブラキサン:壊死性抗がん剤
	ジェムザール:炎症性抗がん剤
代表的副作用	アブラキサン >10%…骨髄抑制、末梢神経障害、脱毛、筋肉痛、関節痛、皮疹、悪心
	ジェムザール >10%…骨髄抑制、悪心、食欲不振、肝機能障害、倦怠感、皮疹 1~10%…間質性肺炎、血管炎 <1%…溶血性尿毒症症候群

【注意事項】

(アブラキサン)

- (※)懸濁液は生食を使用し、5mg/mL(アブラキサン 1 バイアル(100mg)あたり 20mL)となるように調製する
- 人血清アルブミンを使用した特定生物由来薬品です。初回には「化学療法同意書」以外に「**特定生物由来薬品に関する説明・同意書**」も取得してください。

(ジェムザール)

- (投与時間 30 分を遵守する。(60 分以上の投与時間で毒性の頻度と程度が増強したとの報告があるため)

レジメン登録承認	2015年4月7日 化学療法委員会
参考資料	Von Hoff,DD et al.: Increased Survival in Pancreatic Cancer with nab-Paclitaxel plus Gemcitabine: N. Engl. J. Med. 2013;369(18) 1691