


膵臓癌 04

対象疾患:膵臓癌

【0404】GEM+TS-1 療法

【投与スケジュール】 1コース=21日(3週)



【投与日のタイムテーブル】

<注射>

滴下順	薬品名	用量	投与時間	Day1	8	21
①	グラニセトン 3mg バック	1本	30分	↓	↓	休薬完了
	デカドロン(3.3mg/1mL)	2管				
②	ジェムザール	1000mg/m ²	30分	↓	↓	
	生理食塩液 100mL	1本				
③	生理食塩液 50mL	1本	5分 (ルートリンス)	↓	↓	
内服	エスワンタイホウ配合 OD錠	1日2回	朝夕食後	14日服用・7日休薬		

<内服>

薬品名	体表面積	1日投与量	用法
エスワンタイホウ 配合 OD錠	BSA < 1.25 m ²	60mg/日 (朝 40mg、夕 20mg)	朝・夕食後
	1.25 ≤ BSA < 1.5 m ²	80mg/日 (20mg錠 4錠/日)	
	BSA ≥ 1.5 m ²	100mg/日 (25mg錠 4錠/日)	

【催吐性リスク】

軽度リスク

【組織障害性】

ジェムザール:炎症性

【注意事項】

(ジェムザール)

 投与時間 30分を遵守する。(60分以上の投与時間で毒性の頻度と程度が増強したとの報告あり)

(エスワンタイホウ)

 レジメンオーダーとは別に別途処方入力を行う