

胆道癌 02

対象疾患:胆道癌

【0502】GC 療法

【投与スケジュール】 1コース=21日(3週)

1コース

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W	4W	5W	6W
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	25 mg/m ²	↓ Day1	↓ Day8		↓ Day1	↓ Day8	
ジェムシタビン	ジェムザール	GEM	1000mg/m ²	↓ Day1	↓ Day8		↓ Day1	↓ Day8	

【投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
内服	アプレピタント 125mg	1 カプセル	シスプラチン開始 60~90 分前
主管 ①	生理食塩液 1000mL	1 本	持続
	硫酸 Mg 補正液 1mEq/mL	10mL	
側管 ①	アロキシ(0.75mg/5mL)	1V	30 分
	デカドロン(3.3mg/1mL)	3A	
	生理食塩液 100mL	1 本	
側管 ②	シスプラチン注	25mg/m ²	60 分
	生理食塩液 250mL	1 本	
側管 ③	ジェムザール	1000mg/m ²	30 分
	生理食塩液 100mL	1 本	
側管 ④	20%マンニトール 300mL	1 本	30 分

※アプレピタントは Day2-3 と Day9-10 午前中にも 1 回 80mg 内服

【催吐性リスク】

高度リスク

【組織障害性】

シスプラチン:炎症性

イリノテカン:炎症性

【注意事項】

(シスプラチン)

- 光に対して不安定なため、直射日光を避け、点滴時間が 6 時間を超える場合は遮光して投与すること
- 腎毒性軽減のため、十分な量の補液が必要である。尿量や体重の変動に注意し、必要に応じ利尿剤を追加すること

(ジェムザール)

- 投与時間 30 分を遵守する。(60 分以上の投与時間で毒性の頻度と程度が増強したとの報告がある)