

胆道癌 03

対象疾患:胆道癌

## 【0503】GCS 療法

【投与スケジュール】 1コース=14日(2週)

1コース

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	25 mg/m <sup>2</sup>	↓ Day1	
ジェムシタビン	ジェムザール	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	↓ Day1	
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	エスワンタイホウ	S-1	80-120mg/m <sup>2</sup> /日	7日間服用	7日間休薬

## 【投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
内服	アプレピタント 125mg	1 カプセル	シスプラチン開始 60~90 分前
主管 ①	生理食塩液 1000mL	1 本	持続
	硫酸 Mg 補正液 1mEq/mL	10mL	
側管 ①	パロノセトロン(0.75mg/5mL)	1V	30 分
	デカドロン(3.3mg/1mL)	3A	
	生理食塩液 100mL	1 本	
側管 ②	シスプラチン注	25mg/m <sup>2</sup>	60 分
	生理食塩液 250mL	1 本	
側管 ③	ジェムザール	1000mg/m <sup>2</sup>	30 分
	生理食塩液 100mL	1 本	
側管 ④	マンニトール S 300mL	1 本	30 分

※アプレピタントは Day2-3 と Day9-10 午前中にも 1 回 80mg 内服

## 【エスワンタイホウ用法・用量】

体表面積	1日用量(mg)	1日用量(錠)	用法
1.25 m <sup>2</sup> 未満	80mg	20mg 錠を 4 錠	1 日 2 回 朝・夕食後 7 日間服用 7 日間休薬
1.25 m <sup>2</sup> 以上 1.50 m <sup>2</sup> 未満	100mg	25mg 錠を 4 錠	
1.50 m <sup>2</sup> 以上	120mg	20mg 錠を 6 錠	

催吐性	高度
組織傷害性	シスプラチン注:炎症性 ジェムザール:炎症性
代表的副作用	シスプラチン注 >10%…悪心・嘔吐、食欲不振、倦怠感、腎機能障害、骨髄抑制 1~10%…聴力障害、末梢神経障害、電解質異常(低 Mg 血症) ジェムザール >10%…骨髄抑制、悪心、食欲不振、肝機能障害、倦怠感、皮疹 1~10%…間質性肺炎、血管炎 エスワンタイホウ >10%…悪心・嘔吐、食欲不振、下痢、口内炎、骨髄抑制、倦怠感、色素沈着 頻度不明…流涙

### 【注意事項】

(シスプラチン)

- ・光に対して不安定なため、直射日光を避け、点滴時間が 6 時間を超える場合は遮光して投与すること
- ・腎毒性軽減のため、十分な量の補液が必要である。尿量や体重の変動に注意し、必要に応じ利尿剤を追加すること

(ジェムザール)

投与時間 30 分を遵守する。(60 分以上の投与時間で毒性の頻度と程度が増強したとの報告がある)