

胆道癌 04

対象疾患:胆道癌

【0504】GS 療法

【投与スケジュール】 1コース=21日(3週)

1コース

| 一般名 | 商品名 | 略号 | 投与量 | 1W | 2W | 3W |
|----------------------|----------|-----|----------------------------|--------|--------|-------|
| ゲムシタピン | ジェムザール | GEM | 1000mg/m ² | ↓ Day1 | ↓ Day8 | |
| テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム | エスワンタイホウ | S-1 | 60-100mg/m ² /日 | 14日間服用 | | 7日間休薬 |

【投与日のタイムテーブル】

| 滴下順 | 薬品名 | 用量 | 投与時間 |
|-----|-----------------------|-----------------------|----------------|
| ① | グラニセトロンバッグ(3mg/100mL) | 1本 | 30分 |
| | デカドロン(3.3mg/1mL) | 2管 | |
| ② | ジェムザール | 1000mg/m ² | 30分 |
| | 生理食塩液 100mL | 1本 | |
| ③ | 生理食塩液 50mL | 1本 | 5分 (ルートリンス) |

【エスワンタイホウ用法・用量】

| 体表面積 | 1日用量(mg) | 1日用量(錠) | 用法 |
|---|----------|-----------|----------------------------------|
| 1.25 m ² 未満 | 60mg | 20mg 錠を3錠 | 1日2回 朝・夕食後 14日間服用 7日間休薬 |
| 1.25 m ² 以上 1.50 m ² 未満 | 80mg | 20mg 錠を4錠 | |
| 1.50 m ² 以上 | 100mg | 20mg 錠を5錠 | |

| | |
|--------|--|
| 催吐性 | 軽度 |
| 組織傷害性 | ジェムザール:炎症性 |
| 代表的副作用 | ジェムザール >10%…骨髄抑制、悪心、食欲不振、肝機能障害、倦怠感、皮疹 1~10%…間質性肺炎、血管炎 エスワンタイホウ >10%…悪心・嘔吐、食欲不振、下痢、口内炎、骨髄抑制、倦怠感、色素沈着 頻度不明…流涙 |

【注意事項】

(ジェムザール)

- 投与時間 30分を遵守する。(60分以上の投与時間で毒性の頻度と程度が増強したとの報告があるため)