

## 【0606b】DCF 療法〔day15〕

※0～5日目は DCF 療法〔day0-5〕を使用してください

## 【投与スケジュール】1 コース=28 日

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W	4W
ドセタキセル	ドセタキセル	DOC	30mg/m <sup>2</sup>	↓ Day1		↓ Day15	
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	80mg/m <sup>2</sup>	↓ Day1			
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5-FU	800mg/m <sup>2</sup>	↓ Day1～5			

※1～5 日目は長時間の水分負荷、連続投与を行うため、入院での施行となります

※こちらは 15 日目のみのレジメンです

## 【投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
<b>Day15</b>			
①	グラニセトンバッグ 3mg/100mL	1 本	30 分
	デカドロン 3.3mg	2 管	
②	ドセタキセル	30 mg/m <sup>2</sup>	60 分
	生理食塩液 250mL	1 本	
③	生理食塩液 50mL	1 本	ルートリンス

催吐性	ドセタキセル:軽度
組織傷害性	ドセタキセル:壊死性
代表的副作用	ドセタキセル >10%…骨髄抑制、悪心嘔吐、脱毛、倦怠感、末梢神経障害、皮疹、爪の変化、感染 <1%…浮腫、体液貯留(胸水など)

## 【注意事項】

(ドセタキセル点滴静注「ヤクルト」)

□ 添加物として無水エタノールを含有しない