

【1402】アテゾリズマブ+Bev 療法

【投与スケジュール】1 コース=21 日(3 週)

1 コース

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W
アテゾリズマブ	テセントリク	ATZ	1200mg	↓ Day1		
ベバシズマブ	アバスチン	Bev,BV,Bmab	15mg/kg	↓ Day1		

【投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液 50mL	1 本	ルート確保
②	テセントリク 1200mg	1 本	60~30 分 (※ ¹)
	生理食塩液 250mL	1 本	
③	生理食塩液 50mL	1 本	5 分
④	アバスチン	15mg/kg	90~30 分 (※ ²)
	生理食塩液 100mL	1 本	
⑤	生理食塩液 50mL	1 本	ルートリンス

(※)テセントリクは初回 60 分、過敏症状等問題なければ 2 回目 30 分と短縮可

(※)アバスチンは初回 90 分、過敏症状等問題なければ 2 回目 60 分、3 回目 30 分と短縮可

<テセントリク>

0.2 又は 0.22 μm のインラインフィルターを使用すること。

催吐性	最小度
組織傷害性	テセントリク、アバスチン: 非炎症性
代表的副作用	テセントリク 1~10%…関節性肺炎、肝機能障害、下痢、皮疹、甲状腺機能低下 <1%…1型糖尿病、膵炎、下垂体機能低下 アバスチン >10%…高血圧、蛋白尿、出血 <1%…血栓塞栓症、消化管穿孔、創傷治癒遅延、可逆性後白質脳症症候群

【注意事項】

(テセントリク)

初回の投与速度は 60 分投与とし、問題が無ければ 30 分と短縮可

(アバスチン)

初回の投与速度は 90 分投与とし、問題が無ければ、60 分、30 分と短縮可

アバスチン(先発品)のみ使用可

レジメン登録承認	2022 年 3 月 化学療法委員会
参考資料	肝癌診療マニュアル第 4 版