

関節リウマチ 01 対象疾患: 関節リウマチ

【5001】アクテムラ

【投与スケジュール】 1コース=4週



一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W	4W	5W
トシリズマブ	アクテムラ	TCZ	8mg/kg	↓ Day1				↓ Day1

【注射薬投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液 100mL	1本	ルート確保用
②	アクテムラ(80mg/5mL)	8mg/kg※	60分 (開始時は緩徐に)
	生理食塩液 250mL	1本	
③	生理食塩液 50mL	1本	5分(ルートリンス)

※レジメン設定上は 800mg/body(8mg/kg を 100kg で使用した場合を仮定)

<アクテムラ>

無菌・ピロジェンフリーのインラインフィルター(ポアサイズ1.2ミクロン以下)を用い独立したラインにて投与すること

組織傷害性	アクテムラ: 非炎症性(明確な基準なし。メーカー回答)
-------	-----------------------------

【注意事項】

(アクテムラ点滴静注用)

- 点滴静注用としてのみ用い、皮下・筋肉内には投与しないこと
- 無菌・ピロジェンフリーのインラインフィルター(ポアサイズ1.2ミクロン以下)を用い独立したラインにて投与すること。
- 他の注射剤、輸液等と混合しないこと。
- 投与開始時は緩徐に点滴静注を行い、患者の状態を十分に観察し、異常がないことを確認後、点滴速度を速め1時間程度で投与すること