

関節リウマチ 02

対象疾患: 関節リウマチ

## 【5002】オレンシア

## 【投与スケジュール】

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W	4W	5W	6W	7W	8W	9W
アバタセプト	オレンシア	ABT	2~4 バイアル	↓		↓		↓				↓ 以降 4 週毎

(用量・用法)※関節リウマチの場合

通常、成人にはアバタセプト(遺伝子組換え)として以下の用量を1回の投与量とし点滴静注する。初回投与後、2週、4週に投与し、以後4週間の間隔で投与を行うこと。

## 【注射薬投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
<b>Day1</b>			
①	生理食塩液 100mL	1 本	ルート確保用
②	オレンシア(250mg/バイアル)	2~4 バイアル	30 分
	生理食塩液 100mL	1 本	
③	生理食塩液 50mL	1 本	5 分(ルートリンス)

※レジメン設定上の Interval は 2 週で設定

※ルート確保用の生理食塩液 100mL はない場合もあります。

&lt;オレンシア&gt;

インラインフィルター(0.2~1.2 ミクロン)を使用すること

組織傷害性

オレンシア:非炎症性(明確な基準なし。メーカー回答)

## 【注意事項】

(オレンシア)

□ 規定投与量は下記のとおりであるが、半量でも効果が同等とのデータがあるため半量で投与することもある

体重	通常用量
60kg 未満	2 バイアル(500mg)
60-100kg	3 バイアル(750mg)
100kg を超える	4 バイアル(1000mg)