


**【9801】【悪性黒色腫】DTIC 単剤療法**

**【投与スケジュール】** 1コース=28日(4週)



**【投与日のタイムテーブル】**

滴下順	薬品名	用量	投与時間	Day 1	2	3	4	5	...	28
①	グラニセトロンバック 3mg/100mL	1本	30分	↓	↓	↓	↓	↓		休薬完了
	デカドロン 3.3mg	3本								
②	ダカルバジン	200mg/body	60分	↓	↓	↓	↓	↓		
	注射用水※ダカルバジン溶解用	20mL								
	生理食塩液 250mL	1本								
③	生理食塩液 50mL	1本	ルート リンス	↓	↓	↓	↓	↓		

**<ダカルバジン>**

調製後の薬液と点滴経路全般を遮光すること(血管痛防止のため)

**【催吐性リスク】**

高度(5-HT3拮抗薬(iv)+アプレピタント(po)+DEX9.9mg(iv))

**【組織障害性】**

ダカルバジン:炎症性

**【注意事項】**

(ダカルバジン)

- 調製時は1バイアル(100mg)あたり10mLの注射用水で溶解し、生食(または5%糖液)で希釈する
- 調製後の輸液ボトル本体のみならず投与中は点滴経路全般を遮光すること。光によって生じる分解産物が血管痛の原因となるとされているため