

悪性腫瘍その他 10 対象疾患:急性骨髄性白血病・骨髄異形成症候群

【9810】【AML/MSD】アザシチジン療法**【投与スケジュール】** 1コース=28日(4週)

1コース												
一般名	商品名	略号	投与量	1	2	3	4	5	6	7	3W	
アザシチジン	ビダーザ	AZA	75mg/m ²	↓ Day1	↓ Day8 ~28							

【注射薬投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1~7			
①	グラニセトロンバッグ(3mg/100mL)	1管	30分
②	ビダーザ	75mg/m ²	10分
	注射用水	※適量	
	生理食塩液 50mL	1本	
③	生理食塩液 50mL	1本	5分

(※)ビダーザ 1バイアル(100mg)あたり注射用水 10mL に溶解、必要量抜取り

催吐性	中等度
組織傷害性	炎症性
代表的副作用	【10%以上】 骨髄抑制、便秘、倦怠感、肝機能障害、注射部位反応 【1~10%】 感染症 【重大な副作用】 骨髄抑制、感染症、出血、間質性肺炎、心障害、肝機能障害、黄疸、腎不全、腎尿細管アシドーシス、低血圧

【注意事項】

- 本剤は用時調製し、調製から1時間以内に投与を終了する。
- 7日間投与であるが、外来では土日祝日を除く7日間。5日間への短縮投与あり。
- 急性骨髄性白血病は、ベネトクラクスと併用する場合あり。

レジメン登録承認	2021年10月28日 化学療法委員会
参考資料	ビダーザ適正使用ガイド(急性骨髄性白血病・骨髄異形成症候群) NCC Guideline Version 3.2021 The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE International Phase3 study of azacitidine vs conventional care regimens in older patients with newly diagnosed AML with >30 % blasts