

悪性腫瘍その他 04 対象疾患:悪性神経膠腫

【9804】【悪性神経膠腫】Bev+TMZ 内服療法(維持療法)

【投与スケジュール】 1コース=28日(4週)

1コース

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W	4W
ベバシズマブ	アバスチン	BEV	10mg/kg	↓ Day1		↓ Day15	
テモゾロミド	テモダール	TMZ	100-200mg/m ²	↓↓↓↓↓ Day1-5※			

※テモダールは Day2-6 でも可

【投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
内服	テモダールカプセル	100-200mg/m ²	1日1回 空腹時
①	アロキシ 0.75mg	1本	30分
	生理食塩液 100mL	1本	
②	アバスチン	10mg/kg	初回 90分 ※問題が無ければ、2回目 60分、3回目 30分と短縮可
	生理食塩液 100mL	1本	
③	生理食塩液 50mL	1本	5分(ルートリンス)
Day2-5			
内服	テモダールカプセル	100-200mg/m ²	1日1回 空腹時

催吐性	中等度リスク(30~90%)
組織障害性	アバスチン:非炎症性抗がん剤
代表的副作用	アバスチン >10%…高血圧、蛋白尿、出血 <1%…血栓塞栓、腸管穿孔、創傷治癒遅延、可逆性後白質脳症症候群
	テモダール >10%…骨髄抑制、悪心、疲労、脱毛、肝機能障害

【注意事項】

(アバスチン)

- 初回の投与速度は 90分投与とし、問題が無ければ、2回目 60分、3回目 30分と短縮可
- 前治療でアバスチンの投与歴があれば投与速度は 60分や 30分への短縮可

(テモダール)

- 必ず空腹時に服用し(少なくとも 4時間以上の絶飲食)、服用後 2時間は飲食を控える
- 1サイクル目 150mg/m²、2サイクル目以降 200mg/m²
- 内服期間は Day2-6 への変更可

レジメン登録承認	2015年6月16日 化学療法委員会
参考資料	アバスチン添付文書、適性使用ガイド 名古屋大学登録レジメン集 Chinot OL, et al.: Bevacizumab plus Radiotherapy-Temozolomide for Newly diagnosed glioblastoma: N Eng J Med 2014;370: 709-722