

悪性腫瘍その他 08 対象疾患:消化管・膵内分泌細胞癌(NEC)

【9808】CE(カルボプラチン+エトポシド)療法

【投与スケジュール】 1コース=28日(4週)

1コース

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W	3W	4W
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC=5	↓ Day1			
エトポシド	エトポシド	VP-16	80mg/m ²	↓ Day1 ↓ Day2 ↓ Day3			

【投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
内服	アプレピタントカプセル 125mg	1Cap	① 開始時
①	アロキシ 0.75mg	1本	30分
	デカドロン 3.3mg/1mL	3管	
	生食 100mL	1本	
②	エトポシド注	80mg/m ²	1時間
	生理食塩液 250mL	1本	
③	カルボプラチン注	AUC=5	1時間
	5%ブドウ糖 250mL	1本	
④	生食 50mL	1本	ルートリンス
Day2,3			
内服	アプレピタントカプセル 80mg	1Cap	分1 午前中
①	デカドロン 3.3mg/1mL	3管	15分
	生理食塩液 50mL	1本	
②	エトポシド注	80mg/m ²	1時間
	生理食塩液 250mL	1本	
③	生食 50mL	1本	ルートリンス

<エトポシド>

・DEHP フリー(もしくは PVC フリー)の点滴セットを使用すること

催吐性	中等度リスク(30~90%)
組織障害性	カルボプラチン: 炎症性抗がん剤
	エトポシド: 炎症性抗がん剤
代表的副作用	カルボプラチン >10%…骨髄抑制(特に血小板減少)、悪心・嘔吐、食欲不振、倦怠感、電解質異常、アレルギー反応
	エトポシド: >10%…骨髄抑制、悪心、嘔吐、口内炎、脱毛、倦怠感

レジメン登録承認	2019年12月 化学療法委員会
参考資料	膵・消化管神経内分泌腫瘍(NET)診療ガイドライン Br J Cancer, 2007 Jul 16; 97(2): 162-9. Epub 2007 Jun 19